PARTE 2 - A primeira fase da Física atômica

2.1. Séries de *Balmer*.

2.2. A discretização da carga elétrica (o elétron).

As experiências de *J.J. Thomson* e de *R. Millikan*.

2.3. Modelo de *Thomson* para o átomo.

2.4. Espalhamento de *Rutherford*: o átomo
“planetário”.

2.5. O modelo de *Bohr* para o átomo.

2.6. A onda de matéria de *de Broglie*.

2.7. A experiência de *Davisson e Germer*.

Muitas das idéias sobre a estrutura atômica e molecular que surgiram no início do século XX estavam, de certo modo, intimamente ligadas ao desenvolvimento da investigação da radiação emitida pela matéria sólida ou gasosa, graças ao trabalho pioneiro dos alemães **Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Kirchhoff**, a partir da invenção do **espectrógrafo óptico** e do desenvolvimento da espectroscopia entre 1855 e 1863

Espectro Atômico e o modelo de Bohr

OBSERVAÇÃO: um objeto a temperatura T (estrela a 6000 K) emite um espectro contínuo de radiação.

Os osciladores atômicos na estrela são muitos e variados – são capazes de emitir radiação sobre um grande intervalo de comprimentos de onda.

Décadas mais tarde da proposta de Planck (radiação do corpo negro) sabia-se que os átomos emitiam um espectro contínuo.

ESPECTRO DISCRETO = num átomo específico – apenas alguns λ 's bem definidos são emitidos em certas posições do espectro

Cada λ emitido = **LINHA**

Cada **elemento** tem seu conjunto de linhas características $\longrightarrow$ **Digital atômica**

Se observou que a intensidade era suprimida em certos λ 's . Além das linhas brilhantes – presença de linhas escuras ou ausência de certos λ 's

Joseph Fraunhofer

1814

Identificou algumas dessas linhas escuras no espectro solar com λ 's emitidos por certos átomos

**Gustav Kirchhoff
& Robert Bunsen**

1861

Observaram linhas de Fraunhofer em espectros de laboratórios, provocadas pela absorção da luz em λ 's específicos por átomos

Átomos tanto emitiam como absorviam radiação em λ 's específicos associados com cada elemento

Milhares de comprimentos de onda emitidos por átomos foram medidos e catalogados

Os espectros obtidos a partir de vapores e de gases incandescentes apresentam aspectos muito diferentes da dos sólidos. São descontínuos, constituídos por riscas, coloridas no espectro visível, *espectros de riscas*.

Em certas condições os espectros descontínuos podem apresentar *bandas*.

Em condições apropriadas essas bandas podem desdobrar-se em riscas.

A cada elemento, no estado atômico, corresponde um espectro de riscas que o caracteriza, isto é, a localização e o número de riscas diferem de elemento para elemento. Os espectros podem ser de *emissão* ou de *absorção*.

Existe um costume de nos referirmos apenas à zona visível do espectro, pois é nela que se incluem as radiações para as quais possuímos a capacidade de traduzir a sua recepção por sensações específicas a que chamamos *cores*.

A constituição do olho humano permite distinguir a sucessão de radiações cujas frequências se situam entre **$4,0 \times 10^{14}$ Hz** (extremo vermelho) e **$7,0 \times 10^{14}$ Hz** (extremo violeta).

Frequências das radiações visíveis do espectro (em hertz)

violeta	$7,0 \times 10^{14}$ a $6,7 \times 10^{14}$
azul	$6,7 \times 10^{14}$ a $6,0 \times 10^{14}$
verde	$6,0 \times 10^{14}$ a $5,3 \times 10^{14}$
amarelo	$5,3 \times 10^{14}$ a $5,1 \times 10^{14}$
laranja	$5,1 \times 10^{14}$ a $4,9 \times 10^{14}$
vermelho	$4,9 \times 10^{14}$ a $4,0 \times 10^{14}$

HIDROGÊNIO - H

MERCÚRIO - Hg

As linhas de um átomo não aparecem todas com igual intensidade
 No caso do Hg a linha mais intensa é a $\lambda=235,6506\text{nm}$

➔ **Fornece uma assinatura do Hg¹⁹⁸**

Pode-se determinar quanto de Hg existe, p.e., numa lata de atum

O Sol emite luz com todas as cores, como já vimos. Mas, essa luz passa por gases relativamente frios na superfície do próprio Sol. Esses gases **absorvem a luz do Sol exatamente nas cores que gostam de emitir**. As linhas escuras **de Fraunhofer** são linhas de absorção de luz

Observando o espectro de absorção na descarga elétrica entre eletrodos de C iluminado com a luz do Sol
FOUCAULT, em 1849, concluiu que a substancia que emite luz de uma dada freqüência também absorve melhor a luz nesta freqüência.

Reforça a idéia de que os fenômenos de EMISSÃO e ABSORÇÃO seriam devidos a uma espécie de ressonância entre a radiação e os átomos de uma substancia

Sugere que os átomos seriam compostos:
MAXWELL: foram estas observações que levaram a conclusão de que o espectro implicava que os átomos tivessem estrutura, ou seja, fossem um sistema capaz de executar movimentos internos de vibração

Na linguagem da **FÍSICA MODERNA** o espectro de emissão de um elemento químico é a imagem da radiação eletromagnética emitida por seus átomos excitados ao retornarem para o seu estado energético fundamental!

EXPERIMENTO DE FRANCK-HERTZ

1914 James Franck + Gustav Hertz realizaram um experimento importante para desvendar aspectos da estrutura atômica da matéria
Objetivo: Determinar a interação de elétrons quando eles passavam através de um gás de átomos

TUBO DE VACUO
COM HG A VAPOR

Franck-Hertz Data

*Nobel prize
in physics,
1925

Fonte de e's = emissão térmica de um catodo aquecido

Os e's são acelerados por uma ddp V_c entre o catodo e a grade

V_c varia durante o experimento

A energia cinética dos e's na grade – se eles não interagem com os átomos de Hg = eV_c

Os e's são desacelerados por uma ddp V_a entre o anodo e a grade (fixo)

Portanto, a K dos e's no anodo (sem interação com os átomos de Hg) $eV_c - eV_a$

➔ Se os e's perdem alguma energia ΔE por interação com os átomos de Hg

➔ $K = eV_c - eV_a - \Delta E$

Os resultados do **experimento de Franck-Hertz** para o mercúrio obtidos varrendo-se a voltagem de aceleração e registrando-se a corrente x voltagem num osciloscópio no modo x-y.
As medidas de separação entre os picos de corrente correspondem a energia de excitação da transição envolvida nos átomos de mercúrio

Observa-se decréscimo na corrente em: $V_c, 2V_c, 3V_c, \dots$

Os pontos em que a corrente decresce : os e's perdem **4.9 eV** por trocas com os átomos de Hg

Fica então difícil atingir o anodo, pois entre a grade e o anodo a V_a não favorece o mov. dos e's ➔ QUEDA da CORRENTE

O espaçamento regular entre os picos é uma medida da energia de transição de um e com o átomo de Hg

$h\nu = E_i - E_f = K = eV_c$

Ou o elétron não perde nenhuma energia ou um múltiplo (quantum) de **4.9 eV...**

O átomo de Hg retorna ao estado gs emitindo um fóton de 4.9 eV

$\lambda = hc/\Delta E = 1240\text{eV.nm}/4.9\text{eV} = 253 \text{ nm}$

SERIES DE BALMER

No final do sec XIX – Ander Angstron realizou medidas de λ 's de 4 linhas visíveis emitidas pelo átomo de H

Joham Balmer

1885

Propôs uma expressão simples para as linhas visíveis no espectro de H $\lambda = Cn^2/n^2 - 4$, $n > 3$

C=constante

Alem disso Balmer predize que outras linhas de H poderiam ser vistas, correspondendo a $n=7,8,9$

λ 's = 396,97 nm

377,02 nm

374,98 nm

E ele estava correto!!!! Todas as linhas existiam e foram descobertas mais tarde

GENERALIZAÇÃO:

$$\lambda = C_m \frac{n^2}{(n^2 - m^2)}, \quad m \text{ e } n \text{ inteiros} \\ n > m$$

**Para cada valor de m – uma série!
Cada série com um nº infinito de linhas**

Hidrogênio poderia emitir um conjunto INFINITO de linhas

Após Balmer:

W. Ritz & JR Rydberg

Generalizaram a formula de Balmer p/ prever outras linhas de outros elementos

$$1/\lambda = R (1/ n^2 - 1/m^2)$$

$$\lambda = n^2 m^2 / [R (n^2 - m^2)]$$

$n \geq m, m > 0$

R depende do elemento

$$R_H = 1.09677576 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R_\infty = 1.09737315 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Constante de Rydberg para o átomo de H

A formula de Rydberg –Ritz funcionava para elementos pesados da mesma forma que para o Hidrogênio

Series das linhas de Hidrogênio

Lyman	m = 1
Balmer	m = 2
Paschen	m = 3
Bracket	m = 4
Pfund	m = 5

Algumas linhas não casavam com a previsão teórica

Existiam variações nas linhas com a T e P

GRANDE regularidade importante de **série** de muitas linhas dos quadrados dos inteiros

RAIOS CATÓDICOS – DESCOBERTA DOS ELÉTRONS

Linha da concepção atomística da matéria.

➡ Inicialmente não se questionava a natureza indivisível do átomo

ENTRETANTO

➡ Conjunto de evidências experimentais apontam para a divisibilidade do átomo

➡ necessidade de se explicar os fenômenos elétricos e magnético

(i) espectroscopia do átomo de H

(ii) eletrolise de Faraday

(iii) efeito Zeeman

(iv) Millikan – medidas precisas da carga do e

(ii) RESULTADOS DO EXPERIMENTO DE FARADAY SOBRE ELETROLISE

Os componentes da solução se dissociam nos eletrodos

A quantidade de massa depositada em cada um dos eletrodos durante um Δt era proporcional a carga Q que percorre o circuito

$$m = K Q$$

K = equivalente eletroquímico K era proporcional a μ / n μ = peso atômico do elemento que constitui a substância depositada em um dos eletrodos e n = valência da substância

$$\frac{\mu}{n} = FK$$

F = 9,65 x 10⁴ C
constante de Faraday

Carga depositada no eletrodo por 1 mol de substancia de valencia unitária

$$F = \frac{\mu}{n} \frac{1}{K} = \left(\frac{\mu}{n}\right) \frac{Q}{m} = \left(\frac{\mu}{m}\right) \frac{Q}{n}$$

$N_A/N =$ número de Avogadro/número de íons

$$F = \frac{N_A}{N} \frac{Q}{n} = \left(\frac{N_A}{n}\right) \frac{Q}{N} = \left(\frac{N_A}{n}\right) q \Rightarrow q = \frac{F}{N_A} n$$

A corrente em uma solução iônica e devido ao movimento de seus íons a carga de cada íons depende de sua valencia

Carga mínima **e = F/N_A → q=ne**

Corresponde a carga de um íon monovalente

Carga de qq íon e um múltiplo da carga elementar
 Carga quantizada (somente números inteiros de carga são transferidos aos eletrodos)

“SE ACEITAMOS A HIPÓTESE DE QUE AS SUBSTANCIAS ELEMENTARES SÃO COMPOSTAS DE ÁTOMOS, NÃO PODEMOS DEIXAR DE CONCLUIR QUE TAMBÉM A ELETRICIDADE, TANTO POSITIVA QUANTO NEGATIVA, SE SUBDIVIDE EM PORÇÕES ELEMENTARES QUE SE COMPORTAM COMO ÁTOMOS DE ELETRICIDADE”

Helmholtz – discurso para Faraday

$$e = F/N_A \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Primeira indicação em favor da existência de uma carga elementar – carga do elétron

1895-1897 evidencias fortes (Zeeman Thonson)

1909 Millikan mediu a carga do elétron!