

4ª LISTA DE MECÂNICA QUÂNTICA I - PG
(2014-1)

1. Considere uma partícula em um poço infinito de largura a , sujeita a uma perturbação

$$V = \alpha \delta(x - a/3)$$

- (a) Calcule a correção em primeira ordem das energias. Identifique os níveis que não sofrem correções de primeira ordem e discuta fisicamente o porquê.
(b) Calcule os três primeiros termos da correção de primeira ordem na função de onda do estado fundamental.

2. O hamiltoniano de um certo sistema é

$$H = \hbar\omega \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} + g \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -i & 2 \\ 1 & 0 & 2i & 0 & 0 \\ 0 & -2i & 0 & 0 & 2 \\ i & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

onde o primeiro termo representa o hamiltoniano não perturbado e o segundo é a perturbação.

- (a) Calcule as correções de primeira e segunda ordem da energia do primeiro nível excitado.
(b) Calcule a correção de primeira ordem dos autoestados do primeiro nível excitado.

Um oscilador harmônico simples em uma dimensão é sujeito a uma perturbação $V = gX$, onde g é uma constante real.

- (a) Calcule a menor correção não nula para a energia do estado fundamental.
(b) Resolva o problema exatamente e compare a correção do item anterior com o que se obtém a partir da expansão da solução exata em potências de g .

3. Considere o um oscilador harmônico isotrópico em 2 dimensões, descrito pelo hamiltoniano

$$H_0 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} (x^2 + y^2).$$

Aplica-se a perturbação $V = g m \omega^2 x y$, onde $g \ll 1$. Obtenha a correção dos três primeiros níveis de energia até 2ª ordem em teoria de perturbação e os autovetores associados até 1ª ordem.

4. Considere um sistema de dois níveis cujos estados estacionários são $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ com energias E_1 e $E_2 > E_1$, respectivamente. Aplica-se sobre o sistema a perturbação pela matriz $V(t) = g \cos \omega t \sigma_x$ na base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$. Suponha que em $t = 0$ o sistema é preparado no estado $|\psi(0)\rangle = |1\rangle$. Encontre a probabilidade de transição para o nível $|2\rangle$ como função do tempo, **sem supor que** $E_2 - E_1 \sim \hbar\omega$. Comente o limite em que $E_2 - E_1 \rightarrow \hbar\omega$.
5. Uma partícula move-se em uma dimensão e sua energia é dada pelo hamiltoniano H_0 , cujas autofunções são $u_n(x) = \langle x | u_n \rangle$ com energias conhecidas. Aplica-se sobre a partícula a perturbação na forma de um pulso propagante com velocidade c , representado pelo termo de interação $V(t) = A \delta(x - ct)$.
- (a) Suponha que em $t \rightarrow -\infty$ a partícula encontre-se no estado fundamental $|u_0\rangle$. Obtenha a probabilidade de transição para um estado final $|u_n\rangle$ quando $t \rightarrow +\infty$.
(b) Utilize a decomposição de Fourier da função delta

$$\delta(x - ct) = \frac{1}{2\pi c} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega[(x/c)-t]},$$

e discuta a conservação da energia para tempos longos.